

VALUTAZIONE DEL RISCHIO TROMBOTICO IN PZ SOTTOPOSTI AD INTERVENTO CHIRURGICO

SIG./RA _____ Et : _____ Data: _____

Tipologia d'intervento: _____

FATTORI PREDISPONENTI INDIVIDUALI	SCORE	TIPOLOGIA D'INTERVENTO	SCORE
Storia di tromboembolia venosa	3	Chirurgia maggiore	3
Trombofilia congenita o acquisita	2	Previsione di prolungata immobilit� post chir.	2
Malignit�	2	Chirurgia gen. in narcosi	2
Et� > 60 aa	2	Chirurgia gen. in anestesia locale	1
Terapia contraccettiva o sostitutiva	2	Chirurgia laparoscopica	1
Obesit� BMI > 35	2		
Coronaropatia o arteriopatia	1		
Sepsi	1		
Sindrome varicosa	1		
Et� < 40 aa	1		

SCORE CALCOLATO: _____

STRATIFICAZIONE DEL RISCHIO E STRATEGIA TERAPEUTICA CONSIGLIATA

SCORE <2	BASSO RISCHIO	Precoce mobilizzazione
SCORE 3-4	RISCHIO INTERMEDIO	Eparina a basso peso molecolare (clexane) a bassa dose*
SCORE >4	ALTO RISCHIO	Eparina a basso peso molecolare (clexane) ad alta dose*

*in caso di IRC avanzata preferire calcieparina

Proseguire il trattamento fino a completa mobilizzazione e cq per una durata non inferiore ai 7 gg, in caso di malignit  o di complicanze postchirurgiche proseguire per almeno 30 gg. In caso di patologia venosa arti inf usare calze antitrombo o bendaggio elastico

Padua score modificato. Ver 2.0